


## 渡航ワクチンの接種回数と有効期間の目安

☆海外渡航が決まったら、早めに予防接種をしてください。

対象疾患	接種回数（未接種の場合）		有効期間/追加接種など
B型肝炎	3回	4週間隔で2回目、初回接種24週後に3回目	(5～)10年以上
A型肝炎	3回	2～4週間隔で2回目、初回接種24週後に3回目	5年以上
狂犬病(GSK社製)	3回	1週間後に2回、更に2～3週後に3回目	1年後1回追加、以後3年毎、または、2年毎の追加接種
日本脳炎	3回	1～4週間隔で2回目、2回目から6ヶ月以上標準1年後に3回目	過去に3回以上の接種歴があれば4～5年毎に1回の追加接種
破傷風	3回	3～8週後に2回目、2回目から6～18ヶ月後に3回目 (標準1年後)	5～10年毎の追加接種
麻しん(麻しん・風しん)	2回	初回接種4週間以上あけて2回目	過去に1回のみ接種の方は渡航前に1回追加接種
おたふくかぜ	2回	初回接種4週間以上あけて2回目	おたふくかぜに罹患したことのない方は2回接種
水痘	2回	初回接種3ヶ月以上あけて2回目	
ジフテリア	3種混合(DPT)、2種混合(DT)の接種歴があれば成人用ジフテリアトキソイドを1回追加接種		1回追加接種で10年間
ポリオ(不活化)	3回	いずれも3週間以上の間隔をあけて2回目、3回目	少なくとも4～5年以上 成人では、通常1～2回の追加接種
髄膜炎菌性髄膜炎	通常1回		複数回の定期接種の国もあります。
肺炎球菌(23価)	通常1回		5年以上あける
带状疱疹 (シングリックス)	2回	初回接種後2～6ヶ月までに2回目	
黄熱(検疫所で実施)	1回		生涯
腸チフス (Typhim Vi)	1回		2年毎の追加接種
ダニ媒介性脳炎	3回		3年間
コレラ	2回		数か月～数年

 当センターで接種していないワクチン